

【ノボ ノルディスク ファーマ製品の安定性について】

● インスリン製剤

使用時を想定したデータを以下の表にまとめました。

未開封あるいは開封後のインスリン製剤は室温に置き始めてから以下の表の期間を参考にご使用下さい。

インスリンアナログ製剤

ノボラピッド [®] 注 ペンフィル [®]	4 週間 30℃以下
ノボラピッド [®] 注 フレックスペン [®]	4 週間 30℃以下
ノボラピッド [®] 注 イノレット [®]	4 週間 30℃以下
ノボラピッド [®] 注 100 単位/ml	4 週間 30℃以下
ノボラピッド [®] 30 ミックス注 ペンフィル [®]	4 週間 30℃以下
ノボラピッド [®] 30 ミックス注 フレックスペン [®]	4 週間 30℃以下
ノボラピッド [®] 50 ミックス注 フレックスペン [®]	4 週間 30℃以下
ノボラピッド [®] 70 ミックス注 フレックスペン [®]	4 週間 30℃以下
レベミル [®] 注 ペンフィル [®]	6 週間 30℃以下
レベミル [®] 注 フレックスペン [®]	6 週間 30℃以下
レベミル [®] 注 イノレット [®]	6 週間 30℃以下

ヒトインスリン製剤

ペンフィル [®] R 注	6 週間 30℃以下
ペンフィル [®] 30R 注-50R 注	6 週間 30℃以下
ペンフィル [®] N 注	6 週間 30℃以下
ノボリン [®] R 注 フレックスペン [®]	6 週間 30℃以下
ノボリン [®] 30R 注-50R 注 フレックスペン [®]	6 週間 30℃以下
ノボリン [®] N 注 フレックスペン [®]	6 週間 30℃以下
イノレット [®] R 注	6 週間 30℃以下
イノレット [®] 30R 注-50R 注	6 週間 30℃以下
イノレット [®] N 注	6 週間 30℃以下
ノボリン [®] R 注 100 単位/ml	6 週間 25℃以下
ノボリン [®] 30R 注 100 単位/ml	6 週間 25℃以下
ノボリン [®] N 注 100 単位/ml	6 週間 25℃以下

● ビクトーザ[®]皮下注 18mg (GLP-1 受容体作動薬)

室温に置き始めて 30 日以内にご使用下さい。

● 成長ホルモン製剤

ノルデイトロピン[®]S 注、ノルデイトロピン[®] ノルディフレックス[®]注、ノルデイトロピン[®] フレックスプロ[®] 注

週に 5 時間、冷蔵庫から出して使用時を想定したデータで 35 日間安定です。

ノボケア相談室

■月曜日から金曜日まで 午前 9 時～午後 6 時

0120-180363

■上記以外の時間、土日・祝日

0120-359516